

Réunion du 14/11/2013 - ROSP Médecin traitant - résultats à fin décembre 2012

	Objectifs cibles	Objectifs Inter- médiaires	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2012	Évolution en points Dec 2012 - Déc 2011
Nombre de dosages de l'HbA1c	≥ 65 %	54	45.9%	48.7%	2.7
Examen du fond d'œil chez diabétiques	≥ 80 %	68	61.3%	61.5%	0.1
Diabétiques à haut risque CV traités par antihypertenseurs et statine	≥ 75 %	65	58.3%	59.9%	1.7
Diabétiques à haut risque CV traités par antihypertenseurs, statine et aspirine faible dosage ou anticoagulant	≥ 65%	52	51.6%	53.5%	1.9
Vaccination antigrippale des plus de 65 ans	≥ 75 %	62	57.8%	56.4%	-1.4
Vaccination antigrippale des 16 à 64 ans en ALD	≥ 75 %	62	35.4%	35.0%	-0.5
Dépistage K sein	≥ 80 %	70	64.9%	64.8%	-0.1
Dépistage K col de l'utérus	≥ 80 %	65	58.7%	57.5%	-1.2
Vasodilatateurs	≤ 5%	7	10.6%	7.1%	-3.5
Benzodiazépines à demi-vie longue	≤ 5%	11	13.7%	12.1%	-1.6
Durée de traitement benzodiazépines	≤ 12%	13	15.0%	15.9%	0.9
Usage pertinent de l'antibiothérapie	≤ 37	40	45.7	44.3	-1.4
Prescription dans le répertoire d'antibiotiques	≥ 90 %	85	78.6%	80.9%	2.3
Prescription dans le répertoire d'IPP	≥ 85 %	68	71.3%	83.1%	11.8
Prescription dans le répertoire de statines	≥ 70 %	46	38.2%	53.8%	15.6
Prescription dans le répertoire d'antihypertenseurs	≥ 65 %	64	64.1%	72.6%	8.5
Prescription dans le répertoire d'antidépresseurs	≥ 80 %	75	66.0%	66.5%	0.5
IEC/ ensemble des prescriptions d'IEC + sartans	≥ 65 %	45	39.4%	39.6%	0.1
Aspirine / ensemble antiagrégants plaquettaires	≥ 85 %	84	82.0%	83.3%	1.3